

Algemene verdoving bij kinderen:

U mag aanwezig zijn wanneer uw kind verdoofd wordt.

Kleine kinderen worden verdoofd dmv een gasmengsel. Uw kind krijgt een masker over de mond en neus. Hij/zij krijgt de opdracht om heel hard in dit masker te blazen. Uw kind valt na enkele malen blazen in slaap. **Hierbij kan het enkele schokkende bewegingen maken, dit is normaal.** Grotere kinderen worden vaak verdoofd met een prikje. Als uw kind slaapt, moet u even in de wachtkamer wachten totdat de ingreep afgelopen is. Vervolgens wordt hij/zij naar de ontwaakruimte gebracht. U mag terug bij uw kind zitten tot hij/zij wakker is. Een kind kan heel onrustig of soms agressief wakker worden. Dit is het gevolg van de medicatie voor de verdoving. In de ontwaakruimte wordt het kind gemonitord en geobserveerd op pijn en misselijkheid. Zo nodig geeft men extra pijnstilling of medicatie voor misselijkheid.

Als uw kind voldoende wakker is, wordt hij/zij terug naar het pediatrische daghospitaal gebracht.

Dienst NKO:

- Dr. M.C. Stevens
- Dr. K. Charlier

Secretariaat NKO:

Telefoon: 016/209571

Verwijderen van amandelen.

Infobrochure voor ouders

Heilig Hartziekenhuis Leuven
Dienst Pediatrie
Naamsestraat 105
3000 Leuven

Telefoon: 016/209402
E-mail: pediatrie@hhleuven.be



Wat?

Amandelen bestaan uit lymfoid weefsel dat **ons immuunsysteem opbouwt**. Ze bevinden zich links en rechts achteraan in de keelholte.

Bij herhaaldelijke ontsteking van dit weefsel of bij vergrote amandelen met klachten van bemerking van de ademhaling en snurken, is het aangewezen om deze te verwijderen.

De taak van de amandelen wordt nadien overgenomen door het overige lymfoid weefsel.

Hoe?

Deze ingreep gebeurt bij kinderen onder algemene verdoving.

Dagopname pediatrie

Omwille van de algemene verdoving moet het kind nuchter zijn. Voor kinderen betekent dit dat ze na 24u 's nachts niets meer mogen eten of drinken. Kleine kinderen met flesvoeding mogen zes uur voor de opname nog een flesje drinken.

Als uw kind ziek is of koorts heeft (meer dan 38°C), kan de ingreep niet doorgaan. Verwittig dan de NKO-arts.

De dag van opname gaat u naar het onthaal om uw kind in te schrijven. Hiervoor brengt u volgende voorwerpen mee:

- identiteitskaart van het kind
- Eventueel kaart van hospitalisatieverzekering
- **Vertrouwd spreekgoed of knuffel**

Vervolgens meldt u zich aan op het pediatrie daghospitaal. Dit bevindt zich op de 3de verdieping van het hoofdgebouw. Hier krijgt uw kind een kamer toegewezen voor de rest van de dag. Uw kind wordt gewogen en de temperatuur wordt gemeten. Uw kind krijgt een operatiehemdje en identificatiebandje. Tijdens de consultatie van de NKO-arts krijgt u een 'informed consent' formulier met pre-operatieve vragenlijst mee. Dit formulier mag u thuis invullen en ondertekenen. Hiermee geeft u uw toestemming om de ingreep te laten doorgaan. Dit formulier wordt samen met u nagekeken.

Voor de ingreep krijgt het kind premedicatie als voorbereiding voor de algemene verdoving. Dit kan rectaal of via de mond gegeven worden. Er wordt ook ibuprofen gegeven. Dit is preventieve pijnstilling. Vervolgens wordt het kind met het bed naar de operatiezaal gereden.

Eén ouder mag aanwezig zijn als het kind verdoofd wordt. **De ingreep duurt ongeveer 45 minuten.** Na de operatie blijft uw kind een poosje in de ontwaakruimte. Eén ouder mag bij hem/haar blijven. Zodra hij/zij voldoende wakker is, wordt hij/zij terug naar de afdeling gebracht.

Als uw kind zich goed voelt, mag hij/zij na 2 uur beginnen met drinken.

In de loop van de namiddag komt de arts langs en bespreekt met u de nazorg. Nadien mag hij/zij naar huis.

Bezoek van broers en zussen kan enkel tussen 18u en 19u.

Verzorging en tips

- Drinken is op de dag van de ingreep het belangrijkste. 's Avonds mag uw kind eventueel iets licht verteerbaar eten bv. Yoghurt, lauwe soep, ...
- De volgende dag mag uw kind malse voeding eten. Geen voeding met scherpe randen zoals chips of frietjes. Het voedsel mag echter niet te warm of te koud zijn. Dit kan gevaar op nabloeding geven. Dit betekent dus geen ijsjes!
- Geef 30 minuten voor de voeding Ibuprofen volgens gewicht. Dit zorgt voor pijnstilling en ontswelling van de keel waardoor het eten gemakkelijker gaat.
- Blijf uw kind stimuleren om te drinken. Voorkom uitdroging. **Geef geen bruisende dranken of fruitsappen, deze prikken teveel.**
- Uw kind kan braken na de operatie. Dit kan een bruine of zwarte kleur hebben. Dit is normaal maar moet nadien verdwijnen. Als uw kind rood bloed braakt:: nabloeding van de wonde in de keel. Kom meteen naar het ziekenhuis.
- Bij koorts neemt u contact op met de NKO-arts of de pediatrie-afdeling.
- **Normaal gezien kan uw kind na een week weer voldoende eten en kan het opnieuw naar de opvang of naar school.**