

Algemene verdoving bij kinderen

Je mag aanwezig zijn wanneer je kind verdoofd wordt.

Kleine kinderen worden verdoofd d.m.v. een gasmengsel. Je kind krijgt dan een masker over de mond en neus. Hij of zij krijgt dan de opdracht om heel hard in dit masker te blazen. Na enkele malen zal je kind vervolgens in slaap vallen. Hierbij kan het enkele schokkende bewegingen maken, dit is normaal. Grotere kinderen worden vaak via een prikje in slaap gedaan. Als je kind slaapt, moet je even in de wachtkamer wachten totdat de ingreep afgelopen is. Vervolgens wordt je kind naar de ontwaakruimte gebracht en mag je terug bij je kind tot hij/zij wakker is. Een kind kan soms heel onrustig of agressief wakker worden. Dit is het gevolg van de medicatie voor de verdoving. In de ontwaakruimte wordt het kind gemonitord en geobserveerd op pijn. Zo nodig geeft men extra pijnstilling. Als je kind voldoende wakker is, wordt hij/zij terug naar het pediatrie daghospitaal gebracht.

Dienst NKO:

- Dr. K. Charlier
- Dr. S. Strobbe
- Dr. K. Samoy
- Dr. M. Bogaerts

Secretariaat NKO: 016/209 571



Deze publicatie is een uitgave van de dienst NKO, in samenwerking met de dienst communicatie van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven.

Datum van afwerking: januari 2019

Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar, aan te vragen via communicatie@hhleuven.be

Verwijderen van amandelen



Infobrochure voor ouders

*Wat houdt het verwijderen
van amandelen in?*

*Hoe verloopt de opname en tips inzake
verzorging.*

Wat zijn amandelen ?

Amandelen bestaan uit lymfoid weefsel dat ons immuunsysteem opbouwt. Ze bevinden zich links en rechts achteraan in de keelholte.

Bij herhaaldelijke ontsteking van dit weefsel of bij vergrote amandelen met klachten van belemmering van de ademhaling en snurken, is het aangewezen om deze te verwijderen.

De taak van de amandelen wordt nadien overgenomen door het overige lymfoid weefsel.

Hoe verloopt de ingreep?

Deze ingreep gebeurt bij kinderen onder algemene verdoving.

Dagopname pediatrie

Omwille van de algemene verdoving moet je kind nuchter zijn. Voor kinderen betekent dit dat ze na 24u 's nachts niets meer mogen eten en drinken. Kleine kinderen met flesvoeding mogen zes uur voor de opname nog een flesje drinken.

Als je kind ziek is of koorts heeft (meer dan 38°C), kan de ingreep niet doorgaan. Verwittig dan de NKO-arts.

De dag van opname ga je eerst naar het onthaal om je kind in te schrijven. Volgende zaken dien je te voorzien:

- Identiteitskaart van je kind
- Eventueel kaart van hospitalisatieverzekering
- Vertrouwd speelgoed of knuffel

Vervolgens meld je je aan op het pediatrisch daghospitaal. Dit bevindt zich op de 3de verdieping van het hoofdgebouw. Hier krijgt je kind een kamer toegewezen voor de rest van de dag. Je kind wordt gewogen en de temperatuur wordt gemeten. Het kind krijgt een operatiehemdje en identificatiebandje aan.

Tijdens de consultatie van de NKO-arts krijg je; als ouder, een 'informed consent' formulier met pre-operatieve vragenlijst mee. Dit formulier mag je thuis invullen en ondertekenen. Hiermee geeft je je toestemming om de ingreep te laten doorgaan. Dit formulier wordt samen met jouw overlopen.

Voor de ingreep krijgt het kind premedicatie als voorbereiding voor de algemene verdoving. Dit wordt via de mond gegeven. Er wordt ook ibuprofensiroop gegeven. Dit is preventieve pijnstilling. Vervolgens wordt het kind in het bed naar de operatiezaal gebracht.

Eén ouder mag aanwezig zijn als het kind verdoofd wordt. De ingreep duurt ongeveer 45 minuten. Na de operatie blijft je kind een poosje in de ontwaakruimte. Eén ouder mag bij hem/haar blijven. Zodra hij/zij voldoende wakker is, wordt hij/zij terug naar de afdeling gebracht.

Als je kind zich goed voelt, mag het na 2 uur iets drinken.

In de loop van de namiddag komt de arts langs en bespreekt met jou de nazorg. Nadien mag hij/zij naar huis. Bezoek van broers en zussen kan enkel tussen 18u en 19u.

Verzorging en tips na ontslag

- Drinken is op de dag van de ingreep het belangrijkste. 's Avonds mag je kind eventueel iets licht verteerbaar eten, bvb. yoghurt, lauwe soep ...
- De volgende dag mag je kind malse voeding eten. Geen voeding met scherpe randen zoals chips of frietjes. Het voedsel mag echter niet te warm of te koud zijn. Dit kan gevaar op nabloeding geven. Eén ijsje per dag is toegelaten.
- Geef 30 minuten voor de voeding Ibuprofensiroop volgens gewicht. Dit zorgt voor pijnstilling en ontswelling van de keel waardoor het eten gemakkelijker gaat.
- Blijf je kind stimuleren om te drinken. Voorkom uitdroging. Geef geen bruisende dranken of fruitsappen, deze prikken teveel.
- je kind kan braken na de operatie. Dit kan een bruine of zwarte kleur hebben. Dit is normaal maar moet nadien verdwijnen. Als je kind rood bloed braakt dan wijst dit mogelijk op nabloeding van de wonde in de keel. Kom meteen naar het ziekenhuis.
- Bij koorts neem je contact op met de NKO-arts of de pediatrie-afdeling.
- Normaal gezien kan je kind na een week weer voldoende eten en kan het opnieuw naar de opvang of naar school.