

Bronchoscopie

Patiënteninformatie (ambulant)

1. Inleiding

Je behandelende arts heeft je reeds uitleg gegeven over het bronchoscopie onderzoek. Op dit infoblad kan je alle informatie rustig nalezen, maar dit is geen vervangmiddel voor een gesprek met je arts of verpleegkundige. Wij wensen je verder een spoedig herstel toe.

2. Algemene informatie over het bronchoscopie onderzoek

Voor het onderzoek

Voor het onderzoek dien je minstens 4 à 6 uur nuchter te zijn. Er zal je gevraagd worden naar gekende allergieën. Breng je arts op de hoogte van de medicatie die je inneemt.

Medicatie zoals stollingsremmers moet je stoppen in overleg met de arts:

Plavix / Clopidogrel
Marcoumar/ Marevan / Sintrom
Xarelto/ Eliquis/ Pradaxa
Hoge dosis Clexane/ Fraxiparine

Enkel Asaflow mag je verder nemen.

Tijdens het onderzoek

Met een fijn en soepel buisje zal de arts via de mond de luchtpijp en de grote luchtpijptakken kunnen bekijken.

Er wordt een infuus geplaatst om een lichte verdoving toe te dienen. De keel wordt verdoofd met een spray voor het naar binnen schuiven van de scoop.

Het onderzoek gebeurt rechtop zittend in een bed. Tijdens het onderzoek kunnen stukjes longweefsel worden afgenomen voor onderzoek. Dit is volledig pijnloos.

Mogelijk moet er een spoeling (lavage) uitgevoerd worden. De dokter zal dan via de scoop steriele vloeistof inspuiten om de luchtpijptakken te spoelen en te reinigen. De vloeistof wordt opnieuw opgezogen en naar het labo gebracht voor onderzoek.

Het volledige onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek moet je nog 1 uur nuchter blijven. Je mag dan niet eten, drinken of roken.

Kreeg je verdoving tijdens het onderzoek? Dan mag je gedurende 24 uur niet met de auto rijden.

3. Mogelijke ongemakken na het onderzoek

Het onderzoek kan gepaard gaan met enkele ongemakken:

- Hoest en kortademigheid
- Bloederige slijmen
- Koorts – griepaal gevoel

Blijf je echter geruime tijd na het onderzoek nog bloederige slijmen ophoesten?
Neem dan contact op met je huisarts.

Na een spoeling (lavage) kan je 's avonds een lichte temperatuursverhoging ervaren.

4. Contactgegevens

Mocht je nog vragen hebben of bij blijvende problemen, dan kan je contact opnemen met de huisarts of pneumoloog.

- Secretariaat inwendige geneeskunde: 016/ 209 123
- Afspraken centrale: 016/ 209 209

Met vriendelijke groeten,

Dr. T. Verniest

Dr. N. Desie

Dr. S. De Bontridder

Dr. N. De Maeyer

✂

Ondergetekende,, verklaart

- De brochure bronchoscopie gelezen te hebben
- De informatie bronchoscopie begrepen te hebben
- Volledig ingelicht te zijn over het onderzoek bronchoscopie, de mogelijke complicaties en in dat geval de noodzakelijke behandelingen
- Dat hij/zij de mondelinge en schriftelijke uitleg voldoende begrepen heeft en de kans kreeg om vragen te stellen die voldoende zijn beantwoord.
- De uitdrukkelijke toestemming te geven voor de uitvoering van het onderzoek bronchoscopie

De geneeskundige klinische praktijk is geen exacte wetenschap en een opsomming van de mogelijke complicaties kan nooit volledig zijn.

De arts gaat geen verbintenis aan over het uiteindelijke resultaat van de ingreep/procedure. Hij zet alle hem ter beschikking gestelde middelen in om een optimaal resultaat te verkrijgen.

Leuven / /

Patiëntenklever

Deze publicatie is een uitgave van de dienst inwendige geneeskunde, in samenwerking met de dienst communicatie van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven.

Datum van laatste afwerking: mei 2023

Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar, aan te vragen via communicatie@hhleuven.be