

Cystoscopie

(Inwendig blaasonderzoek)

Patiënteninformatie



Urologie



Inhoudstafel

1. Inleiding.....	4
1.1. De prostaat	4
2. Het onderzoek.....	5
2.1. Voorbereiding	5
2.2. Uitvoering van het onderzoek.....	5
2.3. Nazorg.....	6
2.4. Bijwerkingen	6
3. Contactgegevens	7

Deze publicatie is een uitgave van de dienst urologie, in samenwerking met de dienst communicatie van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven.

Versienummer: 1.0

Datum van afwerking: juni 2017

Auteur: dr. Alex Breugelmans

Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar, aan te vragen via communicatie@hhleuven.be

Aarzel niet er ons op te wijzen indien er belangrijke tekortkomingen zijn in deze informatiebrochure of indien er onduidelijke paragrafen zijn.

1. Inleiding

Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met je behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door je uroloog aan jou kenbaar gemaakt worden.

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, dan kan je contact opnemen met je huisarts of je uroloog.

1.1. De prostaat

Er zal binnenkort bij jou een cystoscopie worden uitgevoerd. Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een cystoscoop, een dunne holle buis gevuld met glasvezels of een lenzensysteem dat aangesloten is op een lichtbron. Via een lens op het uiteinde van de cystoscoop kan de uroloog door een kijker in de plasbuis en de blaas kijken. Er bestaan buigzame (flexibele) en metalen (starre) cystoscopen. Beide kunnen voor de man en de vrouw gebruikt worden.

Een cystoscopie wordt verricht wanneer er afwijkingen worden vermoed in de plasbuis, het prostaatgebied of de blaas, bijvoorbeeld bij plasproblemen, bloedverlies via de urine of controle bij blaaspoliepen.

2. Het onderzoek

2.1. Voorbereiding

Voor het onderzoek is thuis geen speciale voorbereiding nodig. Het onderzoek vindt poliklinisch plaats door de uroloog in bijzijn van een verpleegkundige. De verpleegkundige brengt je naar een kleedkamer waar je de kleding van het onderlichaam kunt uittrekken, de kleding van het bovenlichaam houd je aan.

Vaak zal het nodig zijn vóór de cystoscopie urine op te vangen voor onderzoek. Als dit bij jou nodig is, vraagt de verpleegkundige je dit tijdig.

Hierna neem je plaats op de onderzoekstafel. Voor het onderzoek is het nodig dat je met gespreide benen, in speciaal hiertoe bevestigde beensteunen, op de onderzoekstafel ligt. Vervolgens wordt de plasbuisopening gereinigd met een ontsmettingsmiddel. In de plasbuis wordt vervolgens wat gel gespoten. Deze gel dient als glijmiddel en als verdovingsmiddel van het slijmvlies, zodat eventuele pijn tot een minimum wordt beperkt. De gel moet één minuut inwerken. Van belang is dat je, voor zover mogelijk, goed ontspannen bent, opdat het inbrengen van de cystoscoop met het minst mogelijke ongemak gepaard kan gaan.

2.2. Uitvoering van het onderzoek

De uroloog brengt de cystoscoop via (de opening van) de plasbuis in de blaas. Via een slangetje aan de cystoscoop verbonden met een zak spoelvloeistof wordt er steriel water in de blaas gebracht. Hierdoor ontplooit de blaas zich en kan je aandrang tot plassen krijgen. Dit gebeurt echter pas op het moment dat de blaas vol is. De blaas zal nooit overvol raken. De uroloog inspecteert de plasbuis en de blaas. Daarna is het onderzoek afgelopen. Wanneer de flexibele scoop gebruikt is, dien je zelf de spoelvloeistof uit te plassen en verlaat je de onderzoekstafel dus met gevulde blaas.

2.3. Nazorg

Je krijgt meteen na het onderzoek de uitslag. Het onderzoek duurt ongeveer 3 tot 5 minuten. Na afloop kan je meteen naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.

2.4. Bijwerkingen

Na het onderzoek kan het eerste uur en bij sommige patiënten gedurende enkele dagen een branderig gevoel bij het plassen optreden en een versterkte plasdrang. Er kan ook wat bloed in de urine zitten. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk. Het is belangrijk dat je na het onderzoek veel drinkt. De blaas en urinewegen worden dan schoongespoeld.

Wanneer je na de procedure langdurig klachten hebt zoals veel pijn of koorts (boven 38,5 graden) of opmerkelijk moeilijker kunt plassen, neem je contact op met je uroloog.

3. Contactgegevens

Secretariaat Urologie

016/209 810

urologie@hhleuven.be

Verpleegafdeling

Algemene Heelkunde (3A)

016/209.257

Spoedgevallendienst

016/209.280

Afspraken dienst

016/209.209

Facturatiedienst

016/209.312

facturatie@hhleuven.be

Opnamedienst

016/209.243

016/209.253

Algemeen nummer

016/209.211

