


# Informatiebrochure Gastroscoopie

## Gastro-Enterologie

Patiënteninformatie





## Inhoudstafel

1.	Inleiding.....	4
1.1.	Wat is een gastroscopie?.....	4
1.2.	Vorbereiding.....	4
1.3.	Het onderzoek.....	5
1.4.	Na het onderzoek.....	5
1.5.	Mogelijke verwickelingen.....	6
1.6.	Geinformeerde toestemming.....	6
2.	Contactgegevens.....	7
3.	Notities.....	7

*Deze publicatie is een uitgave van de dienst gastro-enterologie, in samenwerking met de dienst communicatie van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven.*

*Versienummer: 1.0*

*Datum van afwerking: september 2017*

*Alle rechten voorbehouden*

*Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar, aan te vragen via [communicatie@hhleuven.be](mailto:communicatie@hhleuven.be)*

## 1. Inleiding

Binnenkort onderga je een gastroscopie. In deze brochure vind je meer informatie over deze ingreep.

### 1.1. Wat is een gastroscopie?

Een gastroscopie is een endoscopisch onderzoek van de slokdarm, maag en de twaalfvingerige darm.

De dokter brengt een endoscoop (een soepele buis met een miniatuurcamera) langs de mond in, tot in de maag en de twaalfvingerige darm.

Tijdens dit onderzoek wordt de binnenzijde van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm op ontstekingen, zweren, poliepen, gezwellen en eventueel andere afwijkingen nagekeken.

Zo nodig kunnen we tijdens het onderzoek stukjes weefsel (biopsies) wegnemen, wat volledig pijnloos verloopt. Tijdens het onderzoek kan soms meteen een behandeling gebeuren: zo kunnen we poliepen weghalen of bloedingen stelpen. Ook dit verloopt volledig pijnloos.

### 1.2. Voorbereiding

- Aangezien de endoscoop langs de maag passeert, is het vanzelfsprekend dat deze leeg moet zijn. Dit wil zeggen dat je zes uur voor het onderzoek nuchter moet blijven en dus niets mag eten en drinken.
- Als je een bril draagt, vragen we je om deze af te zetten. Als je een gebitsprothese hebt, vragen we je ook deze te verwijderen.
- Eventuele allergieën voor medicaties vermeld je vooraf.
- Bespreek met je arts of je bloedverdunnende medicatie voor een eventuele ingreep moet stoppen.

### 1.3. Het onderzoek

- We plaatsen een infuus waarlangs we tijdens het onderzoek intraveneuze medicatie zullen toedienen, dit zijn lichte kalmeermiddelen die het onderzoek voor jou comfortabeler maken.
- Je keel wordt met een spray verdoofd.
- Je krijgt een meettoestel op je vinger om het zuurstofgehalte in het bloed te meten.
- Tijdens het onderzoek lig je op je linkerzij. Terwijl de scoop via de mond in de keel wordt gebracht kan je gewoon doorademen, de scoop komt niet in de longen. Het speeksel mag uit de mond lopen. We vragen je om één keer te slikken op het moment dat de scoop passeert.
- Het onderzoek is niet pijnlijk.
- Er wordt tijdens het onderzoek lucht ingeblazen om alles goed te kunnen zien, het is mogelijk dat je daardoor lucht zal opboeren of een opgeblazen gevoel krijgt. Zo nodig worden stukjes weefsel of poliepen weggenomen (beide pijnloos).

### 1.4. Na het onderzoek

- Na het onderzoek moet je nog een half uur wachten met eten en drinken, dit omwille van de keelverdooving zodat je je niet verslikt. Nadien mag je weer normaal eten, tenzij de dokter beslist dat je langer nuchter moet blijven.
- De arts bespreekt de resultaten met jou.
- Je mag de dag van het onderzoek geen voertuig meer besturen, gevaarlijke activiteiten uitvoeren of belangrijke documenten ondertekenen omdat je reflexen en beoordelingsvermogen verminderd kunnen zijn.

## 1.5. Mogelijke verwikkelingen

Een gastroscopie is een zeer veilig onderzoek.

### **Bloeding**

Een bloeding in de maag of slokdarm is zeer zeldzaam maar kan ontstaan bij het nemen van biopsies of bij het wegnemen van een poliep. Deze bloeding kan endoscopisch gestelpt worden.

### **Perforatie**

Een perforatie of een scheurtje in de slokdarm of de maag is extreem zeldzaam en treedt enkel op als er een bepaalde behandeling wordt toegepast zoals het rekken van een vernauwing in de slokdarm.

### **Infectie van de luchtwegen**

Een infectie van de luchtwegen kan optreden indien je je tijdens het onderzoek met maaginhoud verslikt als je niet nuchter bent.

### **Reactie op de medicatie zoals allergie of ademhalingsdepressie**

Een reactie op de medicatie kan doorgaans meteen met medicijnen behandeld worden.

## 1.6. Geïnformeerde toestemming

Via onderstaand formulier geef je aan dat je arts je voldoende geïnformeerd heeft en al je vragen beantwoord heeft. Het ondertekende formulier wordt in jouw medische dossier bewaard.

Ondergetekende, ....., verklaart voldoende over de verschillende aspecten van het onderzoek en zijn verwikkelingen ingelicht te zijn en geeft dan ook toestemming tot het uitvoeren hiervan.

Leuven, .../.../.....

Handtekening:



