

# Poortkatheter Cardio-vaatheelkunde

Patiënteninformatie



## **1. Inleiding**

Je ondergaat in de nabije toekomst een behandeling waarbij op zeer regelmatige basis medicatie intraveneus (in een ader) zal worden toegediend. Deze medicatie is doorgaans irriterend voor de aders van de arm. Bovendien moet er vaak een ader worden aangeprikt, wat niet aangenaam is. Daarom plaatsen we een poortkatheter bij jou.

### **1.1. Wat is een poortkatheter?**

Een poortkatheter is een onderhuids reservoir dat verbonden is aan een katheter die tot in de grote ader net boven het hart doorloopt. De poort kan dan eenvoudig worden aangeprikt en de medicatie komt onmiddellijk centraal in een grote ader terecht.

### **1.2. Waar moet je op letten?**

Voor de plaatsing van de poortkatheter dien je nuchter te zijn, wat wil zeggen dat je de laatste 6 uur niets meer gedronken of gegeten hebt.

Je geeft aan je behandelende arts je medicatie door, in het bijzonder eventuele bloedverdunners. Afhankelijk van het type bloedverdunner dienen deze al dan niet te worden gestopt. Blijvende inname van bepaalde bloedverdunners kan leiden tot uitstel van de ingreep.

### **1.3. Hoe verloopt het plaatsen van een poortkatheter?**

De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving met sedatie. Je krijgt dus ook iets toegediend waarbij je je iets rustiger voelt. Om de ingreep veilig te laten verlopen, gebeurt dit onder steriele omstandigheden in het operatiekwartier.

De poortkatheter wordt doorgaans op de borstspier geplaatst, tegen de rechterschouder aan. In bepaalde gevallen kan dit ook links geplaatst worden.

Er wordt een kleine incisie van een vijftal centimeter gemaakt. Via een ader ter hoogte van de schouder wordt de katheter

opgeschoven en onder radiologische controle exact gepositioneerd. De katheter wordt dan aan het reservoir vastgemaakt. Deze laatste wordt op de borstspier vastgehecht.

Indien je behandeling kort na de ingreep start wordt de poortkatheter al aangeprikt: je poortkatheter is dan klaar voor gebruik. Indien de behandeling pas later is gepland wordt de poortkatheter gespoeld en kan deze later worden aangeprikt.

#### **1.4. Wat na de ingreep?**

- De hechtingen dienen 10 dagen na de ingreep te worden verwijderd.
- Indien de poortkatheter niet wordt gebruikt, dient hij om de 8 weken te worden gespoeld door thuisverpleging.

*Deze publicatie is een uitgave van de dienst cardio-vaatheelkunde, in samenwerking met de dienst communicatie van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven.*

*Versienummer: 1.0*

*Datum van afwerking: september 2017*

*Alle rechten voorbehouden*

*Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar, aan te vragen via [communicatie@hhleuven.be](mailto:communicatie@hhleuven.be)*

