

DAGOPNAME KINDERGENEESKUNDE

Vervolgens meld je je aan op het pediatriesch daghospitaal. Dit bevindt zich op de derde verdieping van het hoofdgebouw. Hier krijgt je kind een kamer toegewezen voor de rest van de dag. Je kind wordt gewogen en de temperatuur wordt gemeten. Het kind krijgt een operatiewondje en identificatiebandje aan.

Tijdens de consultatie van de NKO-arts krijg je, als ouder, een 'informed consent' formulier met pre-operatieve vragenlijst mee. Dit formulier mag je thuis invullen en ondertekenen. Hiermee geef je je toestemming om de ingreep te laten doorgaan. Dit formulier wordt samen met jou overlopen.

Voor de ingreep krijgt het kind premedicatie als voorbereiding voor de algemene verdoving. Dit wordt via de mond gegeven. Er wordt ook ibuprofensiroop gegeven. Dit is preventieve pijnstilling. Vervolgens wordt het kind in het bed naar de operatiezaal gebracht.

Eén ouder mag aanwezig zijn als het kind verdoofd wordt. De ingreep duurt ongeveer 45 minuten. Na de operatie blijft je kind een poosje in de ontwaakruimte. Eén ouder mag bij hem/haar blijven. Zodra hij/zij voldoende wakker is, wordt hij/zij terug naar de afdeling gebracht.

Als je kind zich goed voelt, mag het na 2 uur iets drinken.

In de loop van de namiddag komt je arts langs en bespreekt met jou de nazorg. Nadien mag hij/zij naar huis.

Secretariaat NKO: 016/20.95.71

Deze publicatie is een uitgave van de dienst NKO, in samenwerking met de dienst communicatie van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven. Datum van afwerking: oktober 2021


*Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar, aan te vragen via communicatie@hhleuven.be.*



Naamsestraat 105
3000 Leuven
T 016 20 92 11
www.hhleuven.be

VERWIJDEREN VAN AMANDELEN

INFOBROCHURE VOOR OUDERS



Regionaal ziekenhuis
Heilig Hart Leuven

WAT ZIJN AMANDELEN?

Amandelen bestaan uit lymfoid weefsel dat ons immuunsysteem opbouwt. Ze bevinden zich links en rechts achteraan in de keelholte. Bij herhaaldelijke ontsteking van dit weefsel of bij vergrote amandelen met klachten van belemmering van de ademhaling en snurken, is het aangewezen om deze te verwijderen. De taak van de amandelen wordt nadien overgenomen door het overige lymfoid weefsel.

HOE VERLOOPT DE INGREEP?

Deze ingreep gebeurt bij kinderen onder algemene verdoving.

DAGOPNAME KINDERGENEESKUNDE

Omwille van de algemene verdoving moet je kind nuchter zijn. Voor kinderen betekent dit dat ze 6 uur voor de ingreep niets meer mogen eten en drinken. Als je kind ziek is of koorts heeft (meer dan 38°C), kan de ingreep niet doorgaan. Verwittig dan de NKO-arts. De dag van opname ga je eerst naar het onthaal om je kind in te schrijven. Volgende zaken dien je te voorzien:

- Identiteitskaart van je kind
- Eventueel kaart van hospitalisatieverzekering
- Vertrouwd speelgoed of knuffel

VERZORGING EN TIPS NA ONTSLAG

- Drinken is op de dag van de ingreep het belangrijkste. 's Avonds mag je kind eventueel iets licht verteerbaar eten, bvb. yoghurt, lauwe soep ...
- De volgende dag mag je kind malse voeding eten. Geen voeding met scherpe randen zoals chips of frietjes. Het voedsel mag echter niet te warm of te koud zijn. Dit kan gevaar op nabloeding geven. Eén ijsje per dag is toegelaten.
- Geef 30 minuten voor de voeding Ibuprofensiroop volgens gewicht. Dit zorgt voor pijnstilling en ontzwellen van de keel waardoor het eten gemakkelijker gaat.
- Blijf je kind stimuleren om te drinken. Voorkom uitdroging. Geef geen bruisende dranken of sappen op basis van citrusfruit. Deze prikken teveel.
- Je kind kan braken na de operatie. Dit kan een bruine of zwarte kleur hebben. Dit is normaal maar moet nadien verdwijnen. Als je kind rood bloed braakt dan wijst dit mogelijk op nabloeding van de wonde in de keel. Kom meteen naar het ziekenhuis.
- Bij koorts neem je contact op met de NKO-arts of de afdeling kindergeneeskunde.
- Normaal gezien kan je kind na maximaal één week weer voldoende eten en kan het opnieuw naar de opvang of naar school.

ALGEMENE VERDOVING BIJ KINDEREN

Je mag aanwezig zijn wanneer je kind verdoofd wordt.

Kleine kinderen worden verdoofd d.m.v. een gasmengsel. Je kind krijgt dan een masker over de mond en neus. Hij/zij krijgt dan de opdracht om heel hard in dit masker te blazen. Na enkele malen zal je kind vervolgens in slaap vallen. Hierbij kan het enkele schokkende bewegingen maken, dit is normaal. Grotere kinderen worden vaak via een prikje in slaap gebracht.

Als je kind slaapt, moet je even in de wachtkamer wachten totdat de ingreep afgelopen is. Vervolgens wordt je kind naar de ontwaakruimte gebracht en mag je terug bij je kind tot hij/zij wakker is. Een kind kan soms heel onrustig of agressief wakker worden. Dit is het gevolg van de medicatie voor de verdoving. In de ontwaakruimte wordt het kind gemonitord en geobserveerd op pijn. Zo nodig geeft men extra pijnstilling. Als je kind voldoende wakker is, wordt hij/zij terug naar het pediatrisch daghospitaal gebracht.