

Algemene verdoving bij kinderen:

U mag aanwezig zijn wanneer uw kind verdoofd wordt.

Kleine kinderen worden dmv een gasmengsel in slaap gedaan. Uw kind krijgt een masker over de mond en neus. Het krijgt de opdracht om heel hard in dit masker te blazen. Uw kind valt na enkele malen blazen in slaap. **Hierbij kan het enkele schokkende bewegingen maken, dit is normaal** . Grotere kinderen krijgen vaak een prikje voor de narcose. Als uw kind slaapt, moet u even in de wachtkamer wachten totdat de ingreep afgelopen is. Vervolgens wordt hij/zij naar de ontwaakruimte gebracht. U mag terug bij uw kind zitten tot hij/zij wakker is. Een kind kan heel onrustig of soms agressief wakker worden. Dit is het gevolg van de medicatie voor de verdoving. In de ontwaakruimte wordt het kind gemonitord en geobserveerd op pijn en misselijkheid. Zo nodig geeft men extra pijnstilling of medicatie voor misselijkheid.

Als uw kind voldoende wakker is, wordt hij/zij terug naar het pediatrische daghospitaal gebracht.

Dienst NKO:

- Dr. M.C. Stevens
- Dr. K. Charlier

Secretariaat NKO:

Telefoon: 016/209571

Heilig Hartziekenhuis Leuven
Dienst Pediatrie
Naamsestraat 105
3000 Leuven

Telefoon: 016/209402
E-mail: pediatrie@hhleuven.be

Verwijderen van neuspoliepen

Infobrochure voor ouders



Wat?

Poliepen worden ook wel adenoiden, vegetaties of neusamandelen genoemd. Poliepen bestaan uit lymfoid weefsel **dat ons immuunsysteem opbouwt. Ze bevinden zich** achteraan de neus in de neus-keelholte, **waar zich ook de uitmondning van de buis van Eustachius bevindt (de verbinding tussen neus en oren).**

Bij kinderen zijn de poliepen vaak vergroot en chronisch ontstoken. Hierbij kan u de volgende symptomen bij uw kind zien:

- snurkende ademhaling
- Verstopte neus met open mondademhaling.
- Frequente verkoudheden met hoesten
- Recidiverende oorontstekingen of glue-ear (stroperige slijmerige afscheiding achter het trommelvlies)

Hoe?

Deze ingreep gebeurt bij kinderen onder algemene verdoving.

Dagopname pediatrie:

Omwille van de algemene verdoving moet het kind nuchter zijn. Voor kinderen betekent dit dat ze na 24u 's nachts niets meer mogen eten of drinken. Kleine kinderen met flesvoeding mogen zes uur voor de opname nog een flesje drinken.

Bij koorts (>38°C) kan de ingreep niet doorgaan. Verwittig dan de NKO-arts.

De dag van opname gaat u naar het onthaal om uw kind in te schrijven. Hiervoor brengt u volgende voorwerpen mee:

- identiteitskaart van het kind
- Eventueel kaart van hospitalisatieverzekering

Vervolgens meldt u zich aan op het pediatrische daghospitaal. Dit bevindt zich op de 3de verdieping van het hoofdgebouw. Hier krijgt uw kind een kamer toegewezen voor de rest van de dag. Uw kind wordt gewogen en de temperatuur wordt gemeten. Uw kind krijgt een operatiehemdje en identificatiebandje. Tijdens de consultatie van de NKO-arts krijgt u een 'informed consent' formulier met pre-operatieve vragenlijst mee. Dit formulier mag u thuis invullen en ondertekenen. Hiermee geeft u uw toestemming om de ingreep te laten doorgaan. Dit formulier wordt samen met u nagekeken.

Voor de ingreep krijgt het kind premedicatie als voorbereiding voor de algemene verdoving. Dit kan rectaal of via de mond gegeven worden. Er wordt ook ibuprofensiroop gegeven. Dit is preventieve pijnstilling. Vervolgens wordt het kind met het bed naar de operatiezaal gereden.

Eén ouder mag aanwezig zijn als het kind verdoofd wordt. **De ingreep duurt ongeveer 30 minuten.** Na de operatie blijft uw kind een poosje in de ontwaakruimte. Eén ouder mag bij hem/haar blijven. Zodra hij/zij voldoende wakker is, wordt hij/zij terug naar de afdeling gebracht.

Als uw kind zich goed voelt, mag het beginnen met drinken.

In de loop van de namiddag komt de arts langs en bespreekt met u de nazorg. Nadien mag hij/zij naar huis.

Bezoek van broers en zussen kan enkel tussen 18u en 19u.

Verzorging en tips

- 's Avonds mag uw kind iets licht verteerbaar eten bv. Yoghurt, soep, boterham,...
- De volgende dag mag uw kind terug alles eten **en drinken.** Het voedsel mag echter niet te warm of te koud zijn. Dit kan gevaar op nabloeding geven. Dit betekent dus geen ijsjes!
- Uw kind kan braken na de operatie. Dit kan een bruine of zwarte kleur hebben. Dit is normaal maar moet nadien verdwijnen. Als uw kind rood bloed braakt: nabloeding van de wonde achteraan in de neus. Neem in dit geval contact op met het ziekenhuis.
- Bij neusbloeding: neus lichtjes laten snuiten **of spoelen met fysiologisch serum.**
- Bij koorts neemt u contact op met de NKO-arts of de pediatrie-afdeling.
- Na de ingreep kan het kind bloederig slijm in de mond of neus hebben.
- Uw kind moet voldoende drinken.
- Bij pijn kan u paracetamol of ibuprofen volgens gewicht geven. Minstens 4 uur tussen laten.
- Uw kind is meestal na 2 dagen gerecupeerd.